

Brachysteleum polyphylum*), jediné na Třemšíně v Čechách, Orthotrichum Rogeri, na jeřábu na Třemšíně, Orthotrichum Braunii, na jasaněch v aleji u Podzámeckého dvora, Orthotrichum gymnostemum, na osice v aleji u Podzám. dvora, Ulota Bruchii, na les. stromech na Třemšíně, Neckera pennata, na buku a jedli na Třemšíně, Leskera nervasa, na buku a jeřábu na Třemšíně, Hypnum Crista castrensis, na vrchu Hřebencích u Roželova.

Z lišejníků vyskytují se tu tyto vzácnější druhy:

Cladonia alpestris,**) na Třemšíně, Praze, Hřebencích, Kočce, Parmelia encausta, na Třemšíně, Praze, Hřebencích, Parmelia incurva, na Třemšíně, Praze, Hřebencích, Parmelia stygia, na Třemšíně, Praze, Hřebencích, Parmelia stygia var. panniformis, na Praze, Parmelia pubescens (lanata), na Třemšíně, Parmelia farinacea, na Třemšíně a Praze, Parmelia Mongeotis, na skále Hořovic, Parmeliopsis hyperopta, na skále Hořovic, Třemšíně a Praze, Lobaria pulmonaria, pouze na lipách a javorech na Třemšíně, Lecidia tenabrosa, na Třemšíně, Gyrophora hyperborea, na Praze, Rhizocarpon badia-atrum, na Praze, Rinodina demissa, na Praze, Stereocaulon coralloides, na Teslínech, Lecanora suffurea, Hájek březový u Sedlice.

Houby na Rožmitálsku.

Rožmitálsko je hubnou komorou celých středních Čech. Známo, že se odtud vyveze ročně za 80.000—100.000 Kč hřibů. Na tomto velikém sběru participují ovšem rozsáhlé lesy rožmitálské, jimž vévodí památný Třemšín. Nelze ani zdaleka vypočísti veškerého bohatství zdejší hubné flory. Nás bude zajímat jen zcela malý výběr řidších zjevů.

Amanita (muchomůrka): ampla Pers. (vysoká), strangulata Fr. (smáčkutá), virosa Fr. (jízlivá), hybrida Kuč. (zvrhlá).

Boletus (hřib): fulvidus Fr. (příplavělý), impolitus Krombh. (nelesklý), sericeus Pers. (hedvábný), alutarius Fr. (jirchový).

Cortinarius (pavučinec): muricinus Fr. (nachovcový), serarius Fr. (hedvábný), hircinus Bolt. (čpavý), centrifugus Fr. (odstředivý).

Daldinia (uhelka): concentrica Bolt. (vrstevnatá).

Entoloma (závojenka): aprile Britz. (dubnová), speculum Fr. (lesklá).

*) V r. 1892 zjištěn p. prof. Velenovským.

**) Dle sdělení p. správce Syrovátky, který stař mechy a lišejníky, brouky a motýli redakci dodal, zjistil v Brdech výtečný lichenolog p. V. Los, ředitel šk. v Hořovicích, z rodu Cladonia 49 druhů a variet, z rodu Parmelia 45 druhů a variet a z ostatních 62 rodů 195 druhů a variet.

Helvella (chřapáč): atra König (černý).
Hydnum (lošák): fuligineo-album Schmidt (hnědobílý).
Lactarius (ryzec): cremor Fr. (výtažkový), luridus Pers. (hořký).
Lentinus (houzovec): dentatus Pers. (zubatý), odorus Vill. (vonný).
Lepiota (bedla): illinita Fr. (slizká), Forquignoni Q. (Forquignonova), nymharum Kalchbr. (rusalčí).

Limacium (hlenovka): melizeum Fr. (jablečná), pustulatum Pers. (neštovičná), marzuolum Fr. (raná), limacinum Scop. (mokrý).

Morchella (smrž): costata Ventenat (žebrovaný).

Paxillus (čechratka): giganteus Sow. (obrovská), rhodoxanthus Bres. (zlatclistá).

Pholiota (šupinovka): aurea Pers. (zlatá), capistrata Cooke (ohlávková), filamentosa Schaeff. (tyčinková).

Pleurotus (hlíva): serotinus Schrad. (pozdní).

Pluteus (štítočka): pellitus Pers. (rounatá), affinis Vel. (příbuzná), praestabilis Britz. (plyšová).

Polyporus (choroš): alligatus Fr. (upoutaný), giganteus Pers. (obrovský), nigricans Fr. (černý), vegetus Fr. (statný), fraxineus Bull. (jasanový), spumeus Fr. (pěnový), nidulans Fr. (hnízdivý), arcularius Batsch (plástvový), velutinus Pers. (sametový).

Psalliota: silvicola Vitt. (lesomilá), duriuscula Roze et Rich. (tvrdá), Bernardi Q. (Bernardova), Vaillantii Roze et Rich. (Vaillantova).

Russula (holubinka): amethystina Q. (ametystová), amoena Q. (příjemná), incarnata Q. (masová), melliolens Q. (medovonná), Raoultii Q. (Raoultova), rigida Vel. (tuhá), seperina Dup. (vyhoštěná), serotina Q. (pozdní), velutipes Vel. (sametonohá).

Trametes (outkovec): inodora Fr. (nevonný), cinnabarina Jack. (rumělkový), Trogii Fr. (Trogův).

Tremella (rosolovka): encephala Wild. (mozková), violacea Relh. (fialová), indecorata Somm. (ohyzdná).

Tricholoma (čirůvka): caligatum Viv. (krokodylí), persicolor Fr. (broskvová), grammopodium Bull. (ryhonohá), impolitum Lasch (bezleská), focale Fr. (límcová), ionides Bull. (nachová), arcuatum Bull. (obloukovitá), atrocinerium Pers. (popelavá), humile Pers. (nízká), subpulverulentum Pers. (jínatá), verrucipes Q. (klkonohá).

Volvaria (kukmák): bombycina Schaeff. (bělostný), speciosa Fr. (okázalý), volvacea Bull. (plachetkatý).