

# BULLETIN

DE

12/92

# L'HERBIER BOISSIER

SOUS LA DIRECTION DE

**EUGÈNE AUTRAN**

Conservateur de l'Herbier.

---

**Tome I.**

**1893**

NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN  
LIBRARY

(Chaque Collaborateur est responsable de ses travaux.)

---

**Prix de l'Abonnement**

12 FRANCS PAR AN POUR LA SUISSE. — 15 FRANCS PAR AN POUR L'ÉTRANGER.

Les Abonnements sont reçus  
A L'HERBIER BOISSIER  
CHAMBÉSY près Genève (Suisse).

---

GENÈVE

IMPRIMERIE ROMET. 26. BOULEVARD DE PLAINPALAIS

1893

# LICHENES AMBOINENSES

a cl. D<sup>r</sup> Cam. PICTET

LECTI, QUOS EXAMINAVIT

Dr J. MÜLLER

---

1. *Parmelia tinctorum* Nyl. Pyr. or., p. 16. — Java.
2. *Physcia ægialita* Nyl. Expos. Lich. Nov. Caled., p. 43. — Java.
3. » *integrata* Nyl. Syn., p. 424. — Amboina.
4. » *obsessa* Nyl. Lich. Husn., p. 9. — Amboina.
5. *Patellaria luteola* (Nyl.) Müll. Arg. L. B., n. 988. — Amboina.
6. *Arthonia gregaria* v. *adspersa* (Montg.) Müll. Arg. L. B., n. 1492. — Amboina.
7. *Arthonia Amboinensis* Müll. Arg.; thallus subcaesio-albus, tenuissimus, lævis; apothecia primum orbicularia, subintegra et albida, dein in lobos radiantibus gracilibus accrescentia et 1-1½ mm. diametro æquantia, fusciscentia et demum nigricantia, incomplete cinereo-pruinosa, sicca plano-convexa, numerosa; lamina juniorum hyalina, plane evolutorum fusca; asci obovoidei, 8-sporei; sporæ evolutæ 18 µ longæ et 7 µ latæ, elongato-obovoideæ, utrinque late obtusæ, æqualiter 6-loculares. — Primo intuitu facile pro *A. Antillarum* habenda, sed apothecia sublente graciliora astroideo-ramosa, dein magis fusco-nigricantia et sporæ magis divisæ, loculi nec apicales nec intermedii reliquis longiores. Juxta *A. Loanganam* Müll. Arg. L. Afr. occ., n. 36, locanda est. — Ad caules Bambusarum (ut videtur) in ins. sundaica Amboina.
8. *Opegrapha trilocularis* Müll. Arg.; thallus glauco-virens, tenuissimus, lævigatus; apothecia nigra, numerosa. 1 mm. longa et breviora, 2/10 mm. lata, gracilia, simplicia vulgoque parallela, sessilia, basi utrinque subconstricta; labia arcte conniventia, obtusa, integra; rima angustissima; peritheciis basi completum; sporæ in ascis oblongato-obovoideis 8-næ, circ. 15 µ longæ et 3-3½ µ latæ, regulariter 2-septatæ s. 3-loculares, obtuse fusiformes et rectæ. — Structura singulari sporarum cum neocaledonica *Opegrapha confertula* Nyl. convenit et juxta eam locanda est, sed differt colore thalli, ambitu gracili lirellarum, rima epitheliali. — In ligno Bambusarum (ut videtur), in ins. sundaica Amboina.
9. *Graphis Sayeri* Müll. Arg. L. B., n. 1186. — Amboina.
10. *Graphina insulana* Müll. Arg. Lich. Gazell., p. 56. — Amboina.